

クリニック通信 VOL.77 (2019/5/1)

◆スギ舌下錠『シダキュア』は、発売1年がたち2019.5.1より長期処方可(1ヶ月)となりました。

『シダキュア』は、2018年6月29日に、これまで2014年に発売された舌下免疫療法(SLIT)の液剤、『シダトレン』にかわり、対象もこれまでの12歳以上から、年齢制限なく小児が服薬できる錠剤(一般に5歳以上が目安)として、維持量も2,000JAUから5,000JAUと、より効果の高い、これまでの冷蔵庫保存が必要だった製剤から、室温保存できる、2分間から1分間、薬を舌下に保持するだけで良い、より携帯性にも優れ、治療効果も、さらに向上した製剤として使用可能になりました。

【使用上の注意】

① スギ花粉シーズン中には、舌下免疫療法(SLIT)は治療を開始できません。

(スギ花粉で体が過敏に反応しやすくなっているため。東京の場合、5月中旬以降、治療開始可能と判断できます。)

② 初回の服薬は、院内で30分安静にして、医師が安全確認をすることが必要です。

③アレルギー検査で、スギ花粉がアレルギーの原因であることを確認する必要があります。

【スギ舌下液“シダトレン”から、『シダキュア』に変更する方へ】

① 初めての服薬は、院内で30分安静にして、医師が安全確認をすることが必要です。

●当日は、“シダトレン”を服薬せずに来院して下さい！

(これまで服薬していた“シダトレン”を飲み終える頃においで下さい。)

② 次回は、2週間後、その後は1ヶ月ごとの処方可となります。

③ 薬代は、144円×30日×0.3(保険で3割の場合)=1,296円となりますが、この他に処方箋代等が必要になります。

シダトレン®スギ花粉舌下液からシダキュア®スギ花粉舌下錠におくすりの変更になる患者様へ

おくすりの変更に伴い、服用方法や保管方法等が変わりますので、お間違えないようご注意ください。

いままでのおくすり(液剤) シダトレン®スギ花粉舌下液	これからのおくすり(錠剤) シダキュア®スギ花粉舌下錠
	
服用量 1日1回1包 (維持期:2,000JAU/mL パック)	服用量 1日1回1錠 最初の1週間は2,000JAU錠 2週目以降は5,000JAU錠
服用方法 舌下に滴下し、2分間 保持した後、飲み込む。 その後、5分間 うがいや飲食をしない。	服用方法 舌下に置き、 1分間 保持した後、飲み込む。 その後、5分間 うがいや飲食をしない。
保管方法 冷所(冷蔵庫)	保管方法 室温

【シダキュアスギ花粉舌下錠を服用するときの注意】

- 初めての服用は、医療機関で医師の監督のもと行います。
- 吸湿性を有するため、使用直前に乾いた指でブリスターシートから取り出してください。
- ブリスターシートから取り出す際は、うら面の「はがす」部分からはがし、爪を立てずに指の腹で押し出してください。
- おくすりでわからないことがあれば、医師や薬剤師に相談してください。

詳しくは、患者様向け小冊子
『シダキュアを服用される患者さんへ』をご確認ください。

